

B 847/88
Ard 13
Aktbrl. 118 kopia



HÖGSTA DOMSTOLEN
Ink. 1997 -12- 05
Dnr 04778 /19.....97
Aktbil. nr —

PROTOKOLL

MORDET PÅ STATSMINISTER OLOF PALME

V

***EJ OFFENTLIGA FÖRUNDERSÖKNINGSHANDLINGAR ***

Rikskriminalen~ A2

PROTOKOLL DEL V

1. Protokoll över rättsmedicinsk obduktion den 1 mars 1986

2. Rättsmedicinskt utlåtande

3. Kompletterande utlåtande med bilagor

4. Myndighetsutlåtande från Bundeskriminalamt (BKA) i Wiesbaden beträffande undersökningar för bestämmande av skottavstånd m.m. (m. fotobilaga)

5. Konfidentiell promemoria beträffande telefonavlyssning (m. bilagor).

STATENS RÄTTLÄKARSTATION
STOCKHOLM
Adress: Box 1262
171 25 SOLNA

Dnr: P 719/86

A. År 1986 den 1 mars förrättades på anmodan av polisen på gatan i Stockholm rättsmedicinsk obduktion av döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme 270130-0499, boende Starkyrkobringen 31, Stockholm.

Förrättningen verkställades av undertecknade Å statens rättsläkarstation i Stockholm i närvaro av docent Robert Grundin, obduktionsassistenterna Åke Fredriksson, Gerth Wintérhagen och Stefan Josefsson, krim.komm. Vincent Lange RKT, Stockholms polisdistrikt, Elving Grovedal, RKT, krinsp. Lars Forsberg, RKT, samt dr. Claes Wallin, kir.klin., Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.

B. Av en promemoria från Stockholms polisdistrikt daterad den 1 mars 1986 och undertecknad av N. Linder framgår att Olof Palme sköts till döds den 28 feb 1986 vid ca 23-tiden på Sveavägen i Stockholm.

PROTOKOLL ÖVER RÄTTSMEDICINSK OBDUKTION

Enligt upplysningar av behandlingsläkaren dr. Claes Wallin vid Sabbatsbergs sjukhus var Olof Palme vid ankomsten till Sabbatsbergs sjukhus kliniskt död. Trots återupplivningsåtgärder med s.k. öppen hjärtmassage kunde hans liv ej räddas.

(1 mars 1986)

YTTERE BESIKYNING

- 1. Liket av en ca 59 år gammal, ordanärt byggd man med måttligt full och ordinär muskulatur. Längd ca 175 cm.
- 2. Måttlig allmän likstelhet. Likfläckarna på ryggsidan sparsamt utvecklade, ljus blåliga till färgen, huvudsakligen lokaliserade till ländregionen. Kroppen känns kylig på händer och fötter; i armbålor och ljumskar förmärkes kvarvarande ljummenhet.
- 3. Håret är mellanblont, mäter ca 10-15 cm i längd. I hårbevuxna delen av bak huvudet ses blodbesudling, men inga skador.
- 4. Ca 5 cm ovanför vänstra ögonbrynets yttre kant observeras två stycken parallellt, med ca 2 mm: s inbördes avstånd förlöpare ca 2 mm breda och ca 4 mm långa rödbruna intorkade överhudsskador. Ingen särskorp, ingen svullnad av omgivande sjudelar.
- 5. Både ögonnäsorna är uppsvullda och närvaro av luft i undernasalrymderna känns vid vidröring. Ögonens bindhinner är vita och bliska. Inga blödningar.

STATENS RÄTTSLÄKARSTATION
STOCKHOLM

Adress: Box 1352
171 26 SOLNA

A. Ar 1986 den 1 mars förrättades på anmodan av polismyndigheten i Stockholm rättsmedicinsk obduktion av döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme 270130-0499, boende Storkyrko-
brinken 31, Stockholm. blod.

Förrättningen verkställdes av undertecknade å statens rättsläkarstation i Stockholm i närvaro av docent Robert Grundin, obduktionsassistenterna Ake Fredriksson, Gerth Winterhagen och Stefan Josefsson, krim.komm. Wincent Lange KKT, Stockholms polisdistrikt, Elving Gruvedal, KKT, krinsp. Lars Forsberg, KKT, samt dr Claes Wallin, kir.klin., Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.

B. Av en promemoria från Stockholms polisdistrikt daterad den 1 mars 1986 och undertecknad av N. Linder framgår att Olof Palme sköts till döds den 28 feb 1986 vid ca 23-tiden på Sveavägen i Stockholm.

Enligt upplysningar av behandlande läkare (dr.Claes Wallin) vid Sabbatsbergs sjukhus var Olof Palme vid ankomsten till Sabbatsbergs sjukhus kliniskt död. Trots återupplivningsåtgärder med s.k. öppen hjärtmassage kunde hans liv ej räddas.

C. YTRE BESIKTNING

- Liket av en ca 59 år gammal, ordinärt byggd man med måttligt hull och ordinär muskulatur. Längd ca 175 cm.
- Måttlig allmän likstelhet. Likfläckarna på ryggsidan sparsamt utvecklade, ljus blålila till färgen, huvudsakligen lokaliserade till ländregionen. Kroppen känns kylig på händer och fötter; i armhålorna och ljumskar förmärkes kvarvarande ljummenhet.
- Håret är mellanblont, mäter ca 10-15 cm i längd. I hårbevuxna delen av bakhuvudet ses blodbesudling, men inga skador.
- Ca 6 cm ovanför vänstra ögonbrynets yttre kant observeras två stycken parallellt, med ca 2 mm:s inbördes avstånd förlöpande ca 2 mm breda och ca 4 mm långa rödbruna intorkade överhudsskador. Ingen sårskorpa, ingen svullnad av omgivande mjukdelar.
- Båda ögonregionerna är uppsvällda och närvaro av luft i underhudsvävnaderna känns vid vidröring. Ögonens bindhinnor är glatta och bleka. Inga blödningar.

6. Näsregionen uppvisar inga skador. Näsbenen känns hela. I vänstra näsborren observeras intorkat blod.
7. Läpparna är ljusst blålila missfärgade. Blodbesudling ses på tungan. Munslemhinnan är blek och blodfattig. Välsanerade tänder. Inga skador.
8. Vänster ytteröra är besudlat av blod. Inga skador.
9. Höger ytteröra är rent. Inga skador.
10. Främre halsregionen företer diffust utbredd svullnad. Vid vidröring känns förekomst av luft i underhudsvävnaderna.
11. Bakre halsregionen uppvisar inga skador.
12. Ca 5 cm nedanför högra ytterörats fäste föreligger ett instick med plastkanyl.
13. Strax ovanför högra nyckelbenet i mellersta nyckelbenslinjen ses ett instucket plaströr.
14. Bröstkorgen är ordinär till formen. I bröstkorgens övre del känns dock vid vidröring förekomst av luftbubblor i underhudsfettvävnaderna.
15. Ca 8 cm nedanför adamsäpplet och ca 4 cm nedanför och 1,5 cm till vänster om halsgropens mitt observeras en snett från höger till vänster och nedåt tvärställd skada. Skadan är ca 1,9 - 2,0 cm bred och ca 1,1 cm hög. Skadans kanter är skarpa, här och var något avrundade och är omgivna av en ca 0,1 cm bred intorkad randzon. Skadan fortsätter i form av en kanal in mot bröstkorgens djup. Sårkanterna företer en del minimala vävnadsbryggor. Ingen nedsmutsning eller ned-sotning kring skadan. Skadan är lokaliserad ca 31 cm ovanför naveln och ca 136 - 138 cm ovanför högra hälen.
16. Strax nedanför ovan beskrivna skada observeras ett kirurgiskt tillfogat, snett förlöpande ca 14 cm långt sår ihopsytt med 11 stygn, som sträcker sig till vänster snett nedåt under vänstra bröstvårtan.
17. Bukregionen är spänd. Välläkt snettförlöpande operationsärr i höger nedre kvadrant. Spår efter intorkat blod ses kring naveln. Inga skador.
18. De yttre könsorganen är ordinärt konfigurerade och oskadade.
19. Inget främmande innehåll i ändtarmsöppningen.
20. Inga skador på armarna.
21. Händerna är oskadade. Högra handflatan företer sparsam blodbesudling.

22. Ben och fötter uppvisar inga skador. På båda hälarna ses grov och förtjockad överhud.
23. Ca 140 cm ovanför högra hälen och ca 1 cm till höger om mittlinjen mellan skulderbladen observeras en sårskada från vilken framrinner blod. Skadan mäter ca 1,6 cm i bredd och ca 1,2 cm i höjd och uppvisar fintandade resp. flikiga ränder. Skadan är halvcirkelformad d.v.s. konvext bågformad mot höger medan den vänstra kanten bildar en rak vertikal linje. Centralt i denna skada föreligger en ca 0,5 - 0,6 cm stor vävnadsdefekt som är närmast rund och omgiven av en ca 0,1 - 0,2 cm bred randzon av lätt krossad och fuktig överhud.
24. Från skadan fortsätter en kanal inåt mot bröstkorgens centrala delar.
25. Vid rekonstruktion av en tänkt sårkanal vars öppningar är beskrivna under punkterna 15 och 23 av yttre besiktningen, utan att beröra kroppens inre organ, fastställes att kanalen förlöper bakifrån-framåt, något uppifrån-nedåt i ca 10-15° vinkel samt något från höger till vänster.
26. Efter dissekering av hud och underhudsvävnad från skadeområdet ses att ryggmuskulaturen mellan skulderbladen överallt visar genomgående samma rödbruna färgton utan förekomst av några ljusare partier i anslutning till skadekanalen. Muskelvävnaden runt skadekanalen är blodgenomdränkt i en randzon som är ca 1 cm bred på vänster sida och ca 2 cm bred på höger sida.
27. För övrigt inga yttre förändringar eller skador på någon del av kroppen.

INRE BESIKTNING

28. Huvudsvålen är torr, blek och blodfattig. I vänstra pannregionen, i området motsvarande de i yttre besiktningen beskrivna överhudsskadorna (4) ses en ca 1 cm stor rund blålila missfärgning.
29. Skallens benkapsel och skallbasen är regelbundna till form och tjocklek och uppvisar inga skador.
30. Hjärnans hårda hinna är glatt och blek. Inga blödningar mellan densamma och skalltaket.
31. Hjärnan är ordinär till form och storlek och väger 1.592 g. Vindlingarna är lätt avrundade och på hjärnans

